

HEPATITIS C EN ESPAÑA

Edad	Madrid 1994	España 1996
2-5	0%	
6-10	0%	
11-15	0%	
16-20	0,8%	0,6%
21-30	3,7%	1,8%
31-40	3,9%	3,2%
41-60	2,4%	
16-40	2,8%	1,9%

Tabla I. Prevalencias en población general Consejería Sanidad y S.S. CAM, 1995

Genotipo	Pacientes con Hepatitis Crónica	Donantes de sangre
1a	10%	8,70%
1b	72,40%	79,10%
2	2%	3,20%
3	6,70%	4,10%
4	2,40%	1,80%
5	0	0,70%
1a+1b	2,20%	1,10%
1+2	2,40%	0,20%
1+3	1,80%	0
1+4	0	0,90%

Tabla II. Prevalencia de genotipos de VHC halladas en España en pacientes con hepatitis crónica y en donantes de sangre cuya infección se detectó a través del cribado rutinario de hemodonaciones durante los años 1991-92.

HEPATITIS C EN EL MUNDO

Zona	Población Total (mill)	Anti-HCV Prevalencia	Población Infectada (mill)
África	602	5,30%	31,90
América	785	1,70%	13,10
Mediterráneo Este	466	4,60%	21,30
Europa	858	1,03%	8,90
Sureste Asia	1500	2,15%	32,30
Pacífico Oeste	1600	3,90%	62,20
Total	5811	3,10%	169,70

Tabla III. Datos estimados de prevalencia y población infectada en el mundo. Se han valorado por zona geográfica, con respecto a la población total. Boletín Epidemiológico OMS N°49, Diciembre, 1999.

